

服薬に際して、必ずこの説明文書をお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 類医薬品

生薬製剤

青木かぜ薬

あおきかぜくすり

「青木かぜ薬」は風邪による鼻水、鼻づまり、発熱、せき、頭痛、のどの痛みなどの症状を改善する生薬製剤です。



< 使用上の注意 >



相談すること

- 次の人は服薬前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊娠または妊娠していると思われる方
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 高齢者
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は直ちに服薬を中止しこの文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服薬後次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- 5～6回程度服薬しても症状が良くならない場合

効能・効果

四季風邪・悪寒・発熱・発汗・頭痛・頭重・祛痰・鎮咳・鎮痛等

用法・用量

大人(15歳以上)一貼に水一合五勺を加え三分の一量に煎じ食前に服用する。或いは一日分三貼を一緒に煎じ其の液を三回に温めて分服してもよし。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 15歳未満は服用しないで下さい。

成分・分量

1日量

カッコン・・・5,0g	マオウ・・・4,0g	ケイヒ・・・2,5g	シャクヤク・・・2,5g
チンピ・・・1,5g	コウボク・・・1,5g	ポウフウ・・・1,5g	カンゾウ・・・1,0g
キキョウ・・・1,0g	カンキョウ・・・0,5g		

<成分に関連する注意>

本剤は、生薬を用いた製剤ですから製品により色・味・香りが多少異なることがあります但し効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- 1, 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 2, 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
- 3, 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 4, 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製剤のですから、製品により、薬煎紙等に染着があらわれることがあります但し、効果にかわりはありません。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせはお買い求めのお店または下記にお願いいたします。

有限会社 青木流芳院

鹿児島県南さつま市大浦町 14001 0993-62-2001 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 有限会社 青木流芳院

鹿児島県南さつま市大浦町 14001